

## Treningsscenario 1 Traume

Melding om knivstikk.

Mann i 20 årene funnet med pusteproblemer ute, sent på en kjølig høstkveld.

Kan kun snakke korte setninger.

Sitter lent mot en vegg. Fremstår som uklar. Blodig T-skjorte høyre side like under brystvorten.

*Herfra vil faggruppen at teamene selv skal definere tegn, symptomer og parametere.*

*Transport tid til riktig destinasjon er mer enn 10 minutter.*

*Pasienttilstanden skal defineres som kritisk.*

*Maksimal tidsforbruk for scenariet er 10 minutter.*

*Dette er momentene dere vil bli vurdert etter.*

*Det er viktig at dere tilpasser scenariet slik at alle momenter i scoringsskjemaet inngår.*

**Lykke til med treningen.**

Momenter merket med **(\*\*)** kan være integrert i sekvensen *Primærundersøkelse*. Første evaluering og tiltak. **Alle funn og vurderinger avmeldes til scenariedommerne verbalt.**

Scenario			Total poeng	Tildelt Poeng
Tar hensyn til mulig smittefare ved kroppsvæsker, verbalt eller på annet vis.				
Sikkerhet og åstedsvurdering med beslutning.				
Fastslår antall skadde.				
Ber om ytterligere assistanse hvis nødvendig.				
Vurderer manuell stabilisering av nakke.				
<b>Primærundersøkelse. Første evaluering og tiltak</b>				
Gir muntlig generell informasjon om pasientinntrykk.				
<b>B.</b> Fastslår pasientrespons/ grad av bevissthet. AVPU Våken/ Verbal/ Reagerer på smerte/Reagerer ikke.				
<b>L-</b> Luftvei Åpner og bedømmer luftvei Fjerner obstruksjon hvis nødvendig.				
<b>Å</b> - Åndedrett Bedømmer ventilasjonsfrekvens Bedømmer ventilasjonskvalitet Iverksetter adekvat oksygen administrasjon Behandler nedsatt ventilasjonsevne.				
<b>S</b> - Sirkulasjon Pulskontroll. Vurdering av hud. (farge, temperatur, tilstand, sentral kap.f) Oppdage stor blødning Iverksette tiltak mot blødning				
<i>Det skal kun poengsettes ett riktig alternativ</i>				
<b>Kritisk på bakgrunn av primærundersøkelsen</b>				
<b>Ikke kritisk på bakgrunn av primærundersøkelsen</b>				
<i>Det skal kun poengsettes ett riktig alternativ</i>				
<b>«Stay and play»</b>				
<b>«Load and go»</b>				

Valg av riktig destinasjon knyttet til traumekriterier				
<b>Sekundærundersøkelse</b>				
Re-evaluere primærundersøkelse.				
<b>Systematisk topp til tå undersøkelse</b>				
<b>Hode</b> Inspeksjon av munn, nese, ansiktsflater. (**) Inspeksjon og palpasjon av skalp og ører. Inspeksjon av øyne, skade, pupilleforskjell				
<b>Nakke (**)</b> Kontrollerer posisjon av trachea. Kontrollerer hals vener. Palperer nakke og ryggrad				
<b>Bryst (**)</b> Inspiserer bryst. Palperer bryst. Auskulturer Bryst				
<b>Abdomen/bekken. (**)</b> Inspiserer og palperer abdomen. Vurderer bekken. Vurderer muntlig om mulig skade på perineum/genitalia				
<b>Nedre ekstremiteter. (**)</b> Inspiserer, palperer, vurderer motorikk, sensorisk, distal sirkulasjon.				
<b>Øvre ekstremiteter.</b> Inspiserer, palperer, vurderer motorikk, sensorisk, distal sirkulasjon.				
<b>Vurderer rygg, lumbalområde og sete. (**)</b> Inspiserer og palperer bakside toraks. Inspiserer og palperer lumbalområde og sete.				
<b>Vitale parametere</b> <i>Måling, dokumentasjon og overvåkning av relevante vitale parametere</i> Ventilasjons frekvens Puls frekvens VAS BT SPo2 Etco2 BS 3 avl EKG GCS				
<b>Sykehistorie.</b> Allergier Medisiner Tidligere sykdommer Siste inntak av mat og drikke. Hendelse i forkant, relevant for hendelsen.				
<b>Andre medisinske tiltak</b>				
Perifer venekanyle eller intraossøs inngang.				
Smertestillende tiltak iht til teamets egne prosedyrer				
Væskebehandling i iht teamets egne prosedyrer				
Behandler sekundære sår og skader tilfredsstillende.				
Scenario slutt:			Max score:	Oppnådd:
Poengscore scenariodommere			100	
Poengscore pasientsimulator:				

	<b>Kritiske kriterier som skal besluttes.</b>
	Gjør nedprioriterte tiltak <b>før</b> vurdering/ behandling av truede luftveier, pust og sirkulasjon.
	Gjør beslutninger som medfører fare eller utfører uhensiktsmessige tiltak.